

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae)

« Σκαθάρι των Φοινικοειδών »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (16/4/2018)

(Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου)

Σχετικό (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ,κατευθυντήριες οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τη διαπίστωση ή μή του εχθρού των φοινικοειδών *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae))

Το έντομο *Rhynchophorus ferrugineus*, αποτελεί τον σημαντικότερο εχθρό των φοινικοειδών παγκοσμίως και ταυτόχρονα για την χώρα μας έναν από τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας .

Προσβάλλει πολλά είδη φοινικοειδών και γενικά όλα τα δέντρα της οικογένειας *Palmaeae*, θεωρούνται ευπαθή φυτά στο *R. ferrugineus*.

Συμπτώματα :

- Χαρακτηριστικό μακροσκοπικό σύμπτωμα είναι η καταστροφή της καρδιάς του φοινικοειδούς και η κάμψη των παλιών φύλλων που δίνει στο φυτό όψη ανοικτής ομπρέλας .
- Σε μερικές περιπτώσεις είναι πιθανό να παρατηρηθούν φαγώματα στα φύλλα πριν παρατηρηθεί η οριστική καταστροφή του φοινικοειδούς .
- Σε προχωρημένο στάδιο προσβολής , είναι δυνατό να ακουστεί ήχος σε απόσταση 1-3 cm από τον κορμό του φοινικοειδούς , από τις προνύμφες που τρέφονται στο εσωτερικό του φυτού .



Εικόνες :Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Τρόπος μετάδοσης :

- ο Το έντομο διαδίδεται με την μεταφορά μεγάλων φοινικοειδών (> 8 εκ διάμετρος βάσης κορμού) από περιοχές όπου υπάρχουν προσβεβλημένα φυτά . Κατόπιν της εγκατάστασής του σε μία περιοχή το έντομο μετακινείται πετώντας (έως 1000 μέτρα) ή βαδίζοντας .

Εξάρσεις προσβολών παρατηρούνται το Φθινόπωρο .



Φωτογραφία : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

➤ **Γνωστοποίηση στη Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία .**

Κάθε φυτωριούχος ή ιδιοκτήτης πρέπει , να γνωστοποιεί στην αρμόδια Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης και το τμήμα ποιοτικού & Φυτουγειονομικού ελέγχου (τηλ : 25413 50189-190-191) οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση συμπτωμάτων ή παρουσία επιβλαβών οργανισμών ή κάθε ανωμαλία που παρουσιάζεται στα φοινικοειδή του. Επίσης να γνωστοποιεί για οποιαδήποτε σημαντική μεταφορά , εγκατάσταση φοινικοειδών , σε όλη την έκταση της ΠΕ Ξάνθης και ιδιαίτερα στην ακτίνα της μολυσμένης ζώνης - 3 χλμ που περιλαμβάνει τους παρακάτω οικισμούς και αγροτικές περιοχές : (έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ.: 3215 10/2/2014) ο ΑΒΔΗΡΑ ο ΠΕΖΟΥΛΑ ο ΜΥΡΩΔΑΤΟ ο ΒΕΛΟΝΗ .

και της ουδέτερης ζώνης - 10 χλμ , που περιλαμβάνει τους παρακάτω οικισμούς και αγροτικές περιοχές :

- ◆ ΓΕΝΙΣΣΕΑ - ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΓΙΚΟ - ΜΕΛΙΣΣΑ - ΔΕΚΑΡΧΟ - ΕΞΟΧΗ - ΜΑΓΓΑΝΑ ΜΑΝΔΡΑ - ΠΟΤΑΜΙΑ - ΚΟΥΤΣΟ
- ◆ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ - ΑΒΔΗΡΩΝ -ΜΑΝΔΡΑΣ

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώνει σχετικά για τις επιβεβλημένες ενέργειες .