



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κομοτηνή 27/6/2013

Αριθ.πρωτ.7233

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 1
Ταχ. Κώδικας : 69100, Κομοτηνή
Πληροφορίες : Γεώργιος Γκαντής
: Νίκος Κολάτσος
Τηλέφωνο : 2531.3.50.408 (-410)
FAX : 2531.0.36.700
E-MAIL : u13912@minagric.gr

Προς: 1. Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής,
Λ.Συγγρού 150,
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΘΗΝΑ
2. Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών και
Ποιοτικού Ελέγχου
Καβάλας,
Αγ. Λουκάς-Τέρμα
Αμυνταίου
65110 Καβάλα.

Κοιν. 1. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΑΜΘ
Ενταύθα
2. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας
για Μ.Μ.Ε.
3. ΔΗΜΟΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
(με την παράκληση να
αναρτηθεί στους
Οικισμούς με
βαμβακοκαλλιέργειες)

ΘΕΜΑ: «2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2013»

Με τις επισκέψεις που πραγματοποιούν οι γεωπόνοι της υπηρεσίας μας στις βαμβακοφυτείες και την παρακολούθηση των φερομονικών παγίδων (πράσινο-ρόδινο σκουλήκι) που τοποθετήθηκαν από τις αρχές Ιουνίου σε διάφορα σημεία του νομού μας διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το μήνα Ιούνιο έχουν βελτιώσει την γενική εικόνα της βαμβακοκαλλιέργειας στο Νομό Ροδόπης. Σε πολλές περιοχές όμως εξελίσσεται με μια οψίμιση της τάξεως των 10 ημερών.
2. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα εντομολογικά προβλήματα που να χρίζουν ψεκασμών.
3. Οι παραγωγοί πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα αυτή την περίοδο **την καλλιεργητική διαχείριση** ώστε **να αποφύγουν την υπερβολική βλαστική ανάπτυξη** (δηλαδή το μεγάλο ύψος φυτών και την πλούσια και τρυφερή βλάστηση) **που αποβαίνει σε βάρος της καρποφορίας**. Αυτό μπορούν να το επιτύχουν:
 - με την ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων
 - τις αναγκαίες και μόνο ποσότητες νερού και
 - την χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης όταν έχουμε καλλιεργητικές αστοχίες και καιρικές συνθήκες που αναπτύσσουν φυτά με υπερβολική βλάστηση (κάμπος Ιάσμου, Αμβροσίας, Σάλπης, Αμαράντων, Παμφόρου).

Φυτά με υπερβολική βλαστική ανάπτυξη είναι περισσότερο ευπαθή στις εντομολογικές προσβολές.

Ε.Π.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ